

A 4:

Hinweise:

1. Fällen von Gehölzen außerhalb der Brutzeit

Unvermeidliche Fällungen von Gehölzen müssen außerhalb der Vogelbrutsaison erfolgen, also zwischen August und Februar.

Pflanzenlisten:

Pflanzenliste 1:

Hochstamm, 3xv., mDb, StU 18-20

Acer platanoides in Sorten	Spitzahorn
Betula pendula	Sandbirke
Carpinus betulus in Sorten	Hainbuche
Quercus robur in Sorten	Stieleiche
Sorbus aucuparia	Eberesche
Tilia cordata	Winterlinde

Pflanzenliste 2:

Heister, 3xv., mb, Höhe 100-125

Acer campestre	Feldahorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Cornus sanguinea	Hartriegel
Crataegus monogyna	Eingriffeliger Weißdorn
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare	Liguster
Prunus spinosa	Schlehe
Rhamnus catharticus	Kreuzdorn
Salix caprea	Salweide

Pflanzenliste 3:

Kletterpflanzen

selbstkletternd:

Campsis radicans	Klettertrompete
Hedera helix	Efeu
Hydrangea petiolaris	Kletterhortensie
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'	Wilder Wein

mit Rankhilfe:

Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe
Lonicera sp.	Geißblatt-Arten
Polygonum aubertii	Schlingknöterich
Wisteria sinensis	Blauregen